

Kapalné hnojivo

WUXAL KALCIUM

Výrobce přípravku:	AGLUKON Specialdünger GmbH & Co.KG, Heerdter Landstrasse 199 Düsseldorf, Německo
Držitel rozhodnutí o registraci:	AgroBio Opava, s.r.o. Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov
Registrační číslo:	855
Balí a dodává:	AgroBio Opava, s.r.o. Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel+fax: 553 626 660, e-mail: agrobio@agrobio.cz , www: agrobio.cz
Datum výroby a číslo šarže:	uvedeno na primárním obalu
Doba použitelnosti přípravku:	2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.
Balení:	1 litr v HDPE láhvi

Vlastnost	hodnota
celkový dusík jako N v %	10,0
dusičnanový dusík jako N v %	8,5
močovinový dusík jako N v %	1,3
vápník jako CaO v %	15,0
hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v %	2,0
bór v %	0,05
měď v %	0,04
železo v %	0,05
mangan v %	0,1
molybden v %	0,001
zinek v %	0,02

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Suspenzní hnojivo na bázi dusičnanu vápenatého a močoviny, obsahující dále hořčík a stopové prvky (10-0-0-15-2) pro použití v plodinách s vysokými nároky na vápník, zejména v ovocnářství, vinné révě, v zelinářství a v okrasných rostlinách. Hnojivo je určeno k použití na list. Rostlinami je rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody). Při jeho pravidelném používání není tedy jeho spotřeba rostlinami závislá na jeho množství a formě v půdě a intenzitě transpiračního proudu z kořenů do nadzemních částí rostliny a je zabráněno jeho deficitu.

Dávkování:

V okrasných rostlinách se hnojivo aplikuje podle potřeby v koncentraci 0,1 % (100 ml/100 l); ošetřuje se do skanutí.

V rajčatech a paprice se aplikuje podle potřeby v 7-10 denních intervalech, poprvé 10 dní po nasazení plodů až do doby těsně před sklizní, pod folii či sklem koncentrace 0,1-0,4 %; ošetřuje se do skanutí.

Okurky: koncentrace 0,3-0,5 %, poprvé krátce po nasazení plodů, opakovat po 14 dnech, naposled 2 týdny před poslední sklizní. Salát, čínské zelí, květák: koncentrace 0,3-0,5 %, poprvé krátce po počátku tvoření hlávky, opakovat 1 x týdně. Ošetřuje se do skanutí

Endivie: dávka 5 l/ha či koncentrace 0,3-0,5 %, jedna aplikace 10-14 týdnů po výsadbě; ošetřuje se do skanutí.

Celer, čekanka, růžičková kapusta: 0,3-0,5 %, jedna aplikace 5-7 týdnů před sklizní; postřik musí zasáhnout "srdéčko". Ošetřuje se do sknutí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Přípravek není ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví jedem ani žíravinou. Při náhodném požití většího množství hnojiva mohou nastat křeče a objevit se známky nepravidelné srdeční činnosti. Při práci s přípravkem se vyvarujte jeho požití, potřísnění pokožky a zasažení očí. Používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a eventuelně vhodné brýle. Při práci a po ní až do umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte před dětmi!

Při použití kombinací přípravku s pesticidy je třeba použít ochranné prostředky a dodržet příslušná bezpečnostní opatření, platná pro daný pesticid.

První pomoc:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování:

Přípravek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin, nápojů, krmiv kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, teplotami pod +5° C a nad 30° C, před vlhkem a mechanickým poškozením.

I krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5° C a nad 30° C, před vlhkem a mechanickým poškozením.

I krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5° C může dojít ke změně barvy a vyloučení krystalů. Tato skutečnost není na závadu jeho jakosti, při přípravě aplikační kapaliny dojde ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobku při teplotách okolo 20° C za občasného promíchání či protřepání.

Likvidace zbytků:

Přípravek je dodáván v obalech z polyetylenu, které lze po dokonalém vyprázdnění a vypláchnutí předat po znehodnocení do sběru k recyklaci. Obaly nelze používat k jakýmkoliv jiným účelům! Zbytky hnojiva nevylévejte v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod, ale zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem.